

子どもの予防接種

【ワクチンの種類・対象・回数・接種間隔】

●市内実施医療機関で予約をしてから受けてください。

種類		対象年齢(標準的な接種期間)	接種回数及び標準的な接種間隔			
B型肝炎		1歳に至るまで (標準:生後2か月から9か月に至るまで)	1回目	標準:生後2か月から9か月に至るまでの間に接種		
			2回目	1回目の接種から27日以上の間隔をおいて接種		
			3回目	1回目の接種から139日以上の間隔をおいて接種		
ロタウイルス	ロタリックス(1価)	出生6週0日後から24週0日後まで (標準:初回接種は生後2か月から出生14週6日まで)	1回目	初回接種は14週6日までに経口接種すること		
			2回目	1回目の接種から27日以上の間隔をおいて経口接種		
	ロタテック(5価)	出生6週0日後から32週0日後まで (標準:初回接種は生後2か月から出生14週6日まで)	1回目	初回接種は14週6日までに経口接種すること		
			2回目	1回目の接種から27日以上の間隔をおいて経口接種		
			3回目	2回目の接種から27日以上の間隔をおいて経口接種		
ヒブ Hib (インフルエンザb型)		<標準> 生後2か月から7か月に至るまでに接種開始の場合	初回	1回目	生後2か月から7か月に至るまでの間に接種	
				2回目	1回目の接種から27日(医師が必要と認めた場合は20日)から56日の間隔をおいて接種	
				3回目	2回目の接種から27日(医師が必要と認めた場合は20日)から56日の間隔をおいて接種	
			追加	*2・3回目の接種は生後12か月に至るまでに接種すること 初回(3回)接種終了後、7か月以上(標準:7か月から13か月)の間隔をおいて1回接種		
	生後7か月から12か月に至るまでに接種開始の場合	初回	1回目	生後7か月から12か月に至るまでの間に接種		
			2回目	1回目の接種から27日(医師が必要と認めた場合は20日)から56日の間隔をおいて接種 *2回目の接種は生後12か月に至るまでに接種すること		
		追加	初回(2回)接種終了後、7か月以上(標準:7か月から13か月)の間隔をおいて1回接種			
	1歳から5歳に至るまでに接種開始の場合	1回接種で終了				
小児用肺炎球菌		<標準> 生後2か月から7か月に至るまでに接種開始の場合	初回	1回目	生後2か月から7か月に至るまでの間に接種	
				2回目	1回目の接種から27日以上の間隔をおいて接種 *2回目の接種は生後12か月に至るまでに接種する	
				3回目	2回目の接種から27日以上の間隔をおいて接種 *3回目の接種は生後24か月(標準:生後12か月)までに接種する	
				追加	初回(3回)接種終了後、60日以上の間隔をおいて生後12か月以降(標準:生後12か月から15か月)に1回接種	
			生後7か月から12か月に至るまでに接種開始の場合	初回	1回目	生後7か月から12か月に至るまでの間に接種
					2回目	1回目の接種から27日以上の間隔をおいて接種 *2回目の接種は、生後24か月(標準:生後12か月)までに接種すること
		追加	初回(2回)接種終了後、60日以上の間隔をおいて生後12か月以降に1回接種			
	1歳から2歳に至るまでに接種する場合	1回目	1歳から2歳に至るまでの間に接種			
		2回目	1回目の接種から60日以上の間隔をおいて接種			
	2歳から5歳に至るまでに接種する場合	1回接種で終了				
四種混合 (DPT-IPV) ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ		生後2か月から7歳6か月に至るまで (標準:生後2か月から12か月に至るまで)	1期	初回	1回目	標準:生後2か月から生後12か月に至るまでの間に接種
					2回目	1回目の接種から20日以上(標準:20日から56日)の間隔をおいて接種
					3回目	2回目の接種から20日以上(標準:20日から56日)の間隔をおいて接種
			追加	初回(3回)接種終了後、6か月以上(標準:12か月から18か月)の間隔をおいて1回接種		
五種混合 (DPT-IPV-Hib) ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・Hib		生後2か月から7歳6か月に至るまで (標準:生後2か月から7か月に至るまで)	1期	初回	1回目	標準:生後2か月から生後12か月に至るまでの間に接種
					2回目	1回目の接種から20日以上(標準:20日から56日)の間隔をおいて接種
					3回目	2回目の接種から20日以上(標準:20日から56日)の間隔をおいて接種
			追加	初回(3回)接種終了後、6か月以上(標準:6か月から18か月)の間隔をおいて1回接種		
二種混合 (DT) ジフテリア・破傷風		11歳以上13歳未満 (標準:11歳から12歳に達するまで)	2期	1回接種		
BCG		1歳に至るまで (標準:生後5か月から8か月に達するまで)	標準:生後5か月から生後8か月に至るまでの間に1回接種			
麻しん・風しん混合 (MR)		1歳から2歳に至るまで	1期	1歳を過ぎたら早めに1回接種		
		小学校就学前の1年間にある者(年長児)	2期	小学校就学前の1年間(年長児)に1回接種 (平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれのお子さん)		
水痘 (水ぼうそう)		1歳から3歳に至るまで(水痘にかかったことがある場合は対象外)	1回目	生後12か月から15か月に至るまでの間に接種		
			2回目	1回目の接種から3か月以上(標準:6か月から12か月)の間隔をおいて接種		
日本脳炎		生後6か月から7歳6か月に至るまで	1期	初回	1回目	標準:3歳から4歳に達するまでの間に接種
					2回目	1回目の接種から6日以上(標準:6日から28日)の間隔をおいて接種
			追加	初回(2回)接種終了後、6か月以上(標準:おおむね1年)の間隔をおいて1回接種(標準:4歳から5歳に至るまでの間に接種)		
		9歳以上13歳未満 (標準:9歳から10歳に達するまで)	2期	1回接種		
※平成16年4月2日から平成19年4月1日に生まれた人で、1期(3回分)、2期(1回分)の接種が終了していない場合、不足分を20歳の誕生日の前日までの間、定期接種として接種することができます。						
ヒトパピローマウイルス:HPV (子宮頸がん)		小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の女子(標準:中学1年生)	サーバリックス(2価)	1回目	標準:13歳になる年度初日から末日(中学1年生)までの間に接種	
				2回目	1回目の接種から1か月以上(標準:1か月)の間隔をおいて接種	
				3回目	1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて接種(標準:1回目の接種から6か月以上の間隔をおいて接種)	
			ガーダシル(4価)	1回目	標準:13歳になる年度初日から末日(中学1年生)までの間に接種	
		2回目		1回目の接種から1か月以上(標準:2か月以上)の間隔をおいて接種		
		3回目		2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて接種(標準:1回目の接種から6か月以上の間隔をおいて接種)		
	シルガード9(9価)	1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合	1回目	標準:13歳になる年度初日から末日(中学1年生)までの間に接種		
		2回目	1回目の接種から、5か月以上(標準:6か月)の間隔をおいて接種 *2回目接種が5か月未満での接種の場合は3回接種とする。			
1回目の接種を15歳になってから受ける場合		1回目	標準:13歳になる年度初日から末日(中学1年生)までの間に接種			
		2回目	1回目の接種から1か月以上(標準:2か月以上)の間隔をおいて接種			
		3回目	2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて接種(標準:1回目の接種から6か月以上の間隔をおいて接種)			
*3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましい。						